

Vœux



Score hospitalier de fragilité : un outil prédictif du devenir des patients âgés (≥75 ans)

HEpiFrail
FRANCE

- La fragilité des personnes âgées est estimée par des scores cliniques. Un algorithme utilisant les codages des séjours hospitaliers a validé un score PMSI pour l'évaluation de la fragilité dans plusieurs pays d'Europe.
- L'étude HEpiFrail évaluait en France l'impact du score PMSI de fragilité sur le devenir des patients âgés hospitalisés, avec :
 - score intermédiaire ou élevé associé à \nearrow mortalité à 30 jours et durée prolongée d'hospitalisation (> 10 jours)
 - score élevé associé à \nearrow ré-hospitalisation à 30 jours



Intérêt du score hospitalier de fragilité comme outil de surveillance épidémiologique et d'évaluation des politiques de santé publique pour les personnes âgées, complémentaire de l'évaluation clinique individuelle

Cancer du poumon : Étapes clés du parcours et survie

OncoCentre

- En CVL, délai médian d'initiation d'un traitement après diagnostic : 49 jours**
 - proches de ceux rapportés dans d'autres régions françaises
 - plus court si cancer bronchique à petites cellules (-10 jours) et/ou métastase(s) (-15 jours)
- L'introduction de la thérapie ciblée, par la biologie moléculaire, de certains cancers bronchiques non à petites cellules non opérés permet une amélioration du pronostic, et ce**
 - sans augmentation du délai d'accès au traitement
 - sans impact d'un délai long sur la survie à 1 an

La prise en charge des cancers du poumon en CVL est adaptée malgré la faible densité médicale

CaP Centre
CVL

